

Programação da vacinação contra a Rubéola de 04 a 08 de Agosto

Como parte da pré-campanha contra a Rubéola a Secretaria de Saúde promove para a semana de 04 a 08 de agosto, durante os três turnos, manhã, tarde e noite, a vacina nos seguintes locais:

Shopping (três turnos)

Pólo Comercial (manhã e tarde)

Tenda da Conceição (manhã e tarde até as 18h30)

DETRAN (manhã).

As equipes volantes continuam com a vacinação nas lavanderias, fabricos, concessionárias e oficinas. A partir do dia 05 (terça-feira), será feita a vacinação nas faculdades e cursinhos durante a noite. No dia 06 (quarta-feira) a vacinação será realizada com todo o efetivo do 4º Batalhão (manhã).

Saiba mais

RÚBEOLA E SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA (SRC)

- O que?

Doença infecciosa causada por vírus, que acomete crianças e adultos, embora esteja entre as que os médicos comumente denominam como próprias da infância.

É uma doença exantemática aguda (*manchas avermelhadas na pele*), que apresenta alto contágio. Pode tornar-se potencialmente grave quando acomete mulheres durante a gestação principalmente no primeiro trimestre, pois está relacionada ao risco de abortos, natimortos e malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez, denominada Síndrome da Rubéola Congênita (SRC).

- Aspecto Clínico

Clinicamente é caracterizada por *pontinhos semelhantes a alergia*, iniciando na face, couro cabeludo e pescoço, se alastrando posteriormente para tronco e membros. A febre baixa, um dos sintomas aparecem de 5 a 10 dias antes das manchas.




- Transmissão

O período de transmissão da rubéola começa uma semana antes e vai de cinco até sete dias após o aparecimento do exantema cutâneo (*manchas avermelhadas na pele*). A transmissão para uma pessoa susceptível ocorre através do contato com as secreções respiratórias (*saliva, espirro, tosse*), de uma pessoa infectada, mesmo quando assintomático. O risco de transmissão da rubéola é maior durante o período das manchas.

- Complicações

A principal é a síndrome da rubéola congênita e pode ocorrer mesmo nas gestantes assintomáticas, ou seja, que não apresentam os sintomas.

Síndrome por rubéola



ADAM.

- Tratamento

Não existe um tratamento específico para rubéola e sim para os *sintomas que aparecem com a doença, como febre, dores de cabeça e manchas.*

Os anti-térmicos e analgésicos, casos necessários, podem ser utilizados para controlar a febre. Os medicamentos que contenham em sua formulação o ácido-salicílico não devem ser usados pelo risco de ocorrerem sangramentos (a rubéola diminui o número de plaquetas), e em crianças também pela possibilidade de Síndrome de Reye

Todos os casos devem ser notificados, sempre por um médico para que seja feita a sorologia que dará um diagnóstico preciso da doença e deve ser feito do 5º ao 20º dia das manchas.

- Como se previne

Para se prevenir contra a rubéola é necessário a vacinação a qual é recomendada de rotina aos 15 meses de idade (vacina MMR) e para todos os adultos principalmente os que ainda não tiveram contato com a doença (vacinação de bloqueio). Gestantes não podem ser vacinadas e as mulheres vacinadas devem evitar a gestação até o mês seguinte à vacinação

(foto campanha Vacina 2008)



PollyanaRibeiro
Estagiária (AI)